

Biopsja gruboigłowa i biopsja mammotomiczna piersi

Przygotowanie do badania i postępowanie po biopsji

Biopsja gruboigłowa

pobranie materiału do badania przy użyciu grubej igły, igła wprowadzana przez naciętą skalpelem skórę, badanie w znieczuleniu miejscowym.

Biopsja mammotomiczna

pobranie materiału do badania przy użyciu mammotomu (urządzenie wytwarzające próżnię z igłą z systemem rotacyjnym, rotacja igły wokół własnej osi pozwala na uzyskanie próbki w postaci wielu wycinków z dowolnego miejsca wokół igły biopsyjnej), badanie to przeprowadza się pod kontrolą ultrasonograficzną, badanie w znieczuleniu miejscowym.

Przygotowanie do badania

biopsja wykonywana w warunkach ambulatoryjnych, najczęściej nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania

pacjentka/ pacjent nie musi być na czczo

wyjątkiem może być konieczność odstawienia leków zmniejszających krzepliwość krwi,

osoby zażywające preparaty zmniejszające krzepliwość krwi oraz cierpiące na zaburzenia krzepnięcia (hemofilie) powinny poinformować o tym lekarza zlecającego badanie, lekarz ustali odpowiedni sposób postępowania

Proszę poinformować lekarza o przyjmowanych lekach:

- *rozrzedzających krew np.:* **Acenokumarol, Acard, Warfin, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Aspiryna i jej pochodne NLPZ np. Ibuprofen, Aleve, Nurofen**

- *narkotycznych lekach przeciwbólowych np.:* **Tramadol, Poltram, Fortan, Dolargan, Durogesic plaster**
- *wpływających na hemostazę płytek krwi np.:* **Cilostazol, Tiklopidyna, Tikagrelor, Prasugrel, Kłopidogrel**
- *wpływających na metabolizm prostaglandyn np.:* **Epoprostenol, Kangrelol, Iloprost, Sekeksypag**
- proszę poinformować lekarza o uczuleniach na leki.

Postępowanie po badaniu

- biopsja to badanie, które jest bardzo dobrze znoszone przez pacjentów, w rzadkich przypadkach może wywoływać powikłania np. krwawienie z miejsca pobrania materiału do badania
- opatrunek jałowy i opatrunek uciskowy (przylepiec i bandaż elastyczny) usunąć po 24 godzinach
- po usunięciu opatrunku miejsce wkłucia należy zabezpieczyć jałowym gazikiem (plaster z opatrunkiem do kupienia w aptece)
- przez kilka dni oszczędzający tryb życia (oszczędzanie kończyny górnej po stronie biopsji)
- doraźnie w razie potrzeby leki p/bólowe dostępne bez recepty (np. Paracetamol, Ibuprofen, Pyralgina)
- przez kilka dni po biopsji zalecany prysznic i codzienna zmiana opatrunku na suchy
- nie ma przeciwwskazań do prowadzenia samochodu po biopsji.

Informacja dotycząca wyniku

proszę czekać na SMS

PROSIMY CZEKAĆ NA TELEFON OD KOORDYNATORKI

NIE ZGŁASZAĆ SIĘ PO WYNIK BEZ USTALENIA WIZYTY DO LEKARZA

Odbiór wyniku badania histopatologicznego w trakcie wizyty w Poradni Chorób Piersi
(gabinet 3.22 lub 3.20)

Oczekiwanie na wynik do 10 dni roboczych.