

PROFILAKTYKA WYNACZYNIENIA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH

W trakcie podaży leku

- nie wolno napinać, naciągać drenu przyrządu do przetoczeń podłączonego do kaniuli lub igły portu
- ubranie zapewniające łatwy dostęp do implantowanego portu lub do założenia kaniuli
- przygotować wszystkie potrzebne rzeczy, aby były w pobliżu (np. telefon, książka, woda)
- w przypadku konieczności zmiany pozycji, zatrzymania infuzji wezwać pielęgniarkę
- **obserwować miejsce założenia kaniuli/igły do portu**

Jeżeli występują w okolicy wkłucia objawy takie jak:

- dyskomfort, uczucie pieczenia, ból
- obrzęk w miejscu lub pobliżu miejsca wkłucia
- zaczerwienienie/rumień, przebarwienie skóry, pęcherze
- spadek szybkości przepływu leku/ przerwanie swobodnego przepływu

należy **bezzwłocznie** zgłosić personelowi pielęgniarskiemu, który podejmie odpowiednie działania.

Po zakończeniu podawania leków przeciwnowotworowych mogą pojawić się późne objawy uszkodzenia naczynia żylnego :

- ból kończyny
- miejscowo wzrost ucieplenia
- zaczerwienienie
- obrzęk

Jeżeli zauważy Pan/Pani w domu niepokojące objawy, należy zgłosić się do lekarza prowadzącego leczenie lub lekarza rodzinnego w miejscu zamieszkania.

Informacje dotyczące dalszego postępowania można uzyskać pod numerem telefonu

- Pododdział Chemioterapii Diennej w godz.8.00-18.30 - 85 66 46 769
- Oddział Onkologii Klinicznej IV piętro (całodobowo) - 85 66 46 709
- Oddział Onkologii Klinicznej V piętro(całodobowo) - 85 66 46 751
- Izba Przyjęć BCO - 85 66 46 710